

УДК 514.764.256

# Конформно плоские (псевдо)римановы многообразия с метрической связностью с векторным кручением<sup>1</sup>

Балащенко В.В., Клепиков П.Н., Родионов Е.Д.  
*Белорусский государственный университет,*  
*Алтайский государственный университет*  
*balashchenko@bsu.by, klepikov.math@gmail.com, edr2002@mail.ru*

## Аннотация

Широко известная теорема Вейля–Схоутена дает необходимые и достаточные условия того, что (псевдо)риманово многообразие является конформно плоским. Данная работа посвящена доказательству аналогичной теоремы в случае (псевдо)римановых многообразий с метрической связностью с векторным кручением.

*Ключевые слова:* (псевдо)римановы многообразия, метрическая связность с векторным кручением, конформные деформации.

## 1. Введение и основные результаты

Пусть  $(M, g)$  — (псевдо)риманово многообразие. Определим на данном многообразии метрическую связность  $\nabla$  с помощью формулы

$$\nabla_X Y = \nabla_X^g Y + g(X, Y)V - g(V, Y)X, \quad (1)$$

где  $V$  — некоторое фиксированное векторное поле,  $X$  и  $Y$  — произвольные векторные поля,  $\nabla^g$  — связность Леви-Чивита. Связность  $\nabla$  является одной из трех основных связностей, описанных Э. Картаном в работе [1], и называется метрической связностью с векторным кручением или полусимметрической связностью (с точностью до направления).

Данная связность играет важную роль в случае двумерных поверхностей, так как в этом случае любая метрическая связность является связностью с векторным кручением [1]. В работах [2, 3, 4, 5, 6, 7] изучаются различные аспекты метрических связностей с векторным кручением.

Важная теорема о связи конформных деформаций и метрических связностей с векторным кручением была доказана К. Яно в работе [8].

**Теорема 1.** *Риманово многообразие допускает метрическую связность с векторным кручением, тензор кривизны которой равен нулю, тогда и только тогда, когда оно является конформно плоским.*

Данная теорема также обобщается и на случай псевдоримановой метрики, т.к. доказательство не использует положительную определенность метрического тензора.

Однако более известные условия на конформно плоские многообразия известны как теорема Вейля–Схоутена:

**Теорема 2.** *(Псевдо)риманово многообразие размерности  $n \geq 3$  является конформно плоским тогда и только тогда, когда тензор Схоутена–Вейля равен нулю при  $n = 3$ , или тензор Вейля равен нулю при  $n > 3$ .*

<sup>1</sup>Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант: № 18–31–00033 мол\_а).

Данная работа посвящена изучению (псевдо)римановых многообразий, которые являются конформно плоскими по отношению к метрической связности  $\nabla$  с векторным кручением. То есть таких многообразий, для которых существует конформная деформация метрики такая, что новый метрический тензор имеет нулевой тензор кривизны по отношению к связности  $\tilde{\nabla}$ .

Основным результатом данной работы является доказательство следующей теоремы.

**Теорема 3.** Пусть  $(M, g)$  — (псевдо)риманово многообразие размерности  $n \geq 3$  с метрической связностью с векторным кручением. Тогда  $(M, g)$  является конформно плоским (преобразование типа II) тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия:

- 1-форма  $\pi$  замкнута, т.е.  $d\pi = 0$ ;
- тензор Схоутена–Вейля равен нулю при  $n = 3$ , или тензор Вейля равен нулю при  $n > 3$ .

## 2. Основные обозначения и факты

Пусть  $(M, g)$  — (псевдо)риманово многообразие. Метрическая связность  $\nabla$  с векторным кручением определяется с помощью формулы (1). Зададим следующие тензорные поля связности  $\nabla$  с помощью равенств:

- тензор кривизны

$$R(X, Y)Z = \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_X \nabla_Y Z + \nabla_{[X, Y]} Z;$$

- тензор Риччи

$$r(X, Y) = \text{tr}(Z \rightarrow R(X, Z)Y);$$

- тензор одномерной кривизны

$$A = \frac{1}{n-2} \left( r - \frac{s \cdot g}{2(n-1)} \right),$$

где  $s = \text{tr}_g(r)$  — скалярная кривизна;

- тензор Вейля

$$W(X, Y)Z = R(X, Y)Z - A(X, Z)Y - g(X, Z)\mathcal{A}(Y) + g(Y, Z)\mathcal{A}(X) + A(Y, Z)X,$$

где  $\mathcal{A}(X)$  определяется через равенство  $g(\mathcal{A}(X), Y) = A(X, Y)$ ;

- тензор Схоутена–Вейля

$$SW(X, Y, Z) = (\nabla_Y A)(X, Z) - (\nabla_X A)(Y, Z) + 2\pi(Y)A(X, Z) - 2\pi(X)A(Y, Z),$$

где  $\pi(X) = g(X, V)$ .

Отметим, что определения почти всех тензорных полей совпадают с определениями соответствующих тензоров в случае связности Леви-Чивита. Однако для тензора Схоутена–Вейля необходима поправка в виде двух дополнительных слагаемых. Использование такого определения тензора Схоутена–Вейля необходимо для предложение 1. Также заметим, что, в отличие от случая связности Леви-Чивита, в данном случае тензор Риччи не обязан быть симметричным. Однако верна

**Теорема 4** ([9, 10]). Пусть  $(M, g)$  — (псевдо)риманово многообразие с метрической связностью с векторным кручением. Тогда тензор Риччи является симметричным тогда и только тогда, когда 1-форма  $\pi$  замкнута (т.е.  $d\pi = 0$ ).

**Определение 1.** Пусть  $(M, g)$  — (псевдо)риманово многообразие с метрической связностью  $\nabla$  с векторным кручением. Конформной деформацией метрического тензора  $g$  называется новый метрический тензор  $\tilde{g} = e^{2f}g$ , где  $f$  — некоторая гладкая функция на  $M$ .

Будем говорить, что конформная деформация имеет тип I, если векторные поля под действием преобразования не изменяются, но соответствующие им двойственные 1-формы меняются:  $\tilde{\pi} = e^{2f}\pi$ .

Будем говорить, что конформная деформация имеет тип II, если 1-формы под действием преобразования не изменяются, но соответствующие им двойственные векторные поля меняются:  $\tilde{V} = e^{-2f}V$ .

**Определение 2.** (Псевдо)риманово многообразие  $(M, g)$  с метрической связностью  $\nabla$  с векторным кручением называется конформно плоским, если существует такая конформная деформация, что  $\tilde{g}$  имеет нулевой тензор кривизны относительно связности  $\tilde{\nabla}$ .

### 3. Конформные деформации (псевдо)римановых многообразий с метрической связностью с векторным кручением

Данный раздел посвящен доказательству основного результата работы, а именно теоремы 3.

**Предложение 1.** Пусть  $(M, g)$  — (псевдо)риманово многообразие с метрической связностью  $\nabla$  с векторным кручением размерности  $n \geq 3$ . Тогда тензор Вейля  $W$  и тензор Схоутена–Вейля  $SW$  (при  $n = 3$ ) инвариантны при конформных деформациях (и типа I, и типа II).

Доказательство данного предложения основано на прямых вычислениях, и приводить его мы не будем. Однако, приведем формулу, показывающую как при конформных деформациях типа II изменяется тензор одномерной кривизны:

$$\tilde{A}(X, Y) = \hat{A}(X, Y) - \left( \hat{\nabla}_X \psi \right) (Y) + \psi(X)\psi(Y) - \frac{1}{2}g(X, Y)\|\psi\|^2, \quad (2)$$

где  $\psi = df - \pi$  и  $\hat{A}$  — тензор одномерной кривизны  $(M, g)$  относительно связности Леви-Чивита  $\hat{\nabla}$ .

Для доказательства необходимости условий, приведенных в теореме 3, осталось заметить, что после конформной деформации тензор кривизны  $\tilde{R}$  будет тривиален, а следовательно тензор Риччи  $\tilde{r}$  будет симметричен. Тогда по теореме 4 получаем требуемое.

Докажем достаточность. Предположим, что выполняется: 1-форма  $\pi$  замкнута; тензор Схоутена–Вейля равен нулю при  $n = 3$  или тензор Вейля равен нулю при  $n > 3$ . Тогда, из (2) получаем, что выполняется уравнение

$$\hat{A}(X, Y) - \left( \hat{\nabla}_X \psi \right) (Y) + \psi(X)\psi(Y) - \frac{1}{2}g(X, Y)\|\psi\|^2 = 0.$$

Данное уравнение также появляется в доказательстве теоремы Вейля–Схоутена. Аналогично ему, заключаем, что при выполнении условий теоремы 3 оно имеет решение — функцию  $\psi$ . А следовательно  $df = d\psi + \pi$  является дифференциалом некоторой функции (как минимум локально). Таким образом, достаточность доказана.

В заключении отметим, что случай конформных деформаций типа I является более сложным. Авторам известны лишь необходимые условия в этом случае.

## Список литературы

- [1] Cartan E. Sur les variétés à connexion affine et la théorie de la relativité généralisée (deuxième partie) // Ann. Ecole Norm. Sup. 1925. V. 42. P. 17–88.
- [2] Muniraja G. Manifolds Admitting a Semi-Symmetric Metric Connection and a Generalization of Schur's Theorem // Int. J. Contemp. Math. Sci. 2008. V. 3, No 25. P. 1223–1232.
- [3] Agricola I., Thier C. The Geodesics of Metric Connections with Vectorial Torsion // Annals of Global Analysis and Geometry. 2004. V. 26. P. 321–332.
- [4] Murathan C., Özgür C. Riemannian manifolds with a semi-symmetric metric connection satisfying some semisymmetry conditions // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. 2008. V. 57, No 4. P. 210–216.
- [5] Yilmaz H. B., Zengin F. Ö., Uysal. S. A. On a Semi Symmetric Metric Connection with a Special Condition on a Riemannian Manifold // European journal of pure and applied mathematics. 2011. V. 4, No 2. P. 152–161.
- [6] Zengin F. Ö., Demirbağ S. A., Uysal. S. A., Yilmaz H. B. Some vector fields on a riemannian manifold with semi-symmetric metric connection // Bulletin of the Iranian Mathematical Society. 2012. V. 38, No 2. P. 479–490.
- [7] Agricola I., Kraus M. Manifolds with vectorial torsion // Differential Geometry and its Applications. 2016. V. 46. P. 130–147.
- [8] Yano K. On semi-symmetric metric connection // Revue Roumame de Math. Pure et Appliquees. 1970. V. 15. P. 1579–1586.
- [9] Barua B., Ray A. Kr. Some properties of a semi-symmetric metric connection in a Riemannian manifold // Indian J. pure appl. Math. 1985. V. 16, No 7. P. 736–740.
- [10] De U. C., De B. K. Some properties of a semi-symmetric metric connection on a Riemannian manifold // Istanbul Univ. Fen. Fak. Mat. Der. 1995. V. 54. P. 111–117.